
зала 18 ШКАФЪ 4. полка 3, № 63. Adjar. Me hent. зала 18 шкафъ 4, полка 3, № 63.



# способъ,

какъ

сельскимъ обыва шелямъ пользовашь себя

ВЪ ВОСПЪ.

#### сочиненте

### T. HEKEHA

Коллежскаго Совъшника, Медицины Доктора и Медицинской Коллеги члена и ученаго Секретаря.

### переведено

АЛЕКСБЕМЪ ПРОТАСЬЕВЫМЪ Медицины Докторомъ и анатомти Профессоромъ экстраординарнымъ при императорской акалемти Наукъ.

るるいとなるなんなんないからからなんないかんなんないからんないかんな

BB CAHKTHETEP BY PF B



3.1000 ATATE TO THE TORS



## предризвршение

Можно ли было предпріять мий другое для общества полезнійшее діло, нежели сіе, то есть, чтобы простому народу яснымі и вразумительнымі образомі на россійскомі языкії показать способь, какі пользовать себя ві востії; не чаю: но прежде обіявлю причину, которая побудила меня кії сему предпріятію.

Неоспоримую оную испинну, что вы променентация вы порядка, кои должно наблюдать вы пищь и пиппи, пакже и вы другихы вещахы принадлежащихы кы содержантю больнаго вы воспы, великое множество людей умираеты оты ея преждевремянно, не намырены я здысь утверждать на свидытельствахы врачей. Доказательствы пому достовырныхы и нималому изыяттю неподлежащихы находится довольно и у другихы



другихь писателей, кои сами врачами никогда не бывали. Донны Уллоа, (\*) два браща служившіе у Короля Гишпанскаго во флоть Капишанами, лютость сей болВзни надв Индейцами, кои никакихв оть ея не знають лъкарствь, такимь образомь описывають вы Американскомы своемь пушешесний, чио едва ли кию сыщешся, которой бы читая оное не приведень быль вы крайнее о быдныхы пібхь людяхь сожальніе. Да и вы самомы дыль у Индейцовы оныхы не меньше пропадаеты народу от воспы, как бы от наижесточайшаго мороваго повытрія: напротивы того изь Гишпанцовь, кои родились и жи-вуть вы той же Америкь, и на которыхь она столь же сильна нападаеть, какь и на Индейцовь, однако не столь многіе умирають по тому только, что они употребляють пристойныя кь пользованію себя оть ея средства, коихь Индейцы не знають. Примбрь тому столь же явной показываеть намь отечество наше, Россійское государство. В Сибиръ много больше людей умираеть воспою,

<sup>(\*)</sup> Историческое описанте путешествтя въ южную Америку, учиненнато по повелънтю Короля Гишпанскато Дономъ Георгтемъ Жунаомъ и Дономъ Антонтемъ Деуллоа, и проч. Въ Аместердамъ и лейпцигъ 1752.

нежели здёсь. Тамь очень не многіе отв ея встають; напрошивь того здёсь, когда она и св превеликою лютостію ходитв по народу, изв подверженныхв ей по высокой мърв едва только четвертой челов вк умираеть. При чемь не сомноваюсь я за подлинно у пвердить и сте, что во токо мостахо, гдо всю зараженные сею болбыню опдаются вы лькарское смотрыте, изв десяти, а вы случав, когда она не столь жестока бываеть, изь дватцати, или еще и изь большаго числа едва только одинь человъкь пропадаеть. Сверьхь сего примъры находяться безсомнительные, что локари, коимь вь смотрение поручены были воспяные, иногда столь были щастливы, что у ихв изв пяпидесяти или еще и большаго числа такихв больныхв умерло только по одному человвку. Что же многе разглашають, будто у сельскихв жителей воспа бываеть гораздо сноснве, и не многе отв ея умирають, а по сему со всвмв бы не нужно было для ихв и враневание то мувите сте нимало не сположно чеваніе, що мивніе сіе нимало не справедливо; но напрошивь того за подлинно изникаких вы болбзни сей не упопребляють лъкарей, однако вы оных ведва только половина умираеть противы тъх , кои A 3

от в преждевремянно лишаются жизни своей вы деревняхь. Такы на примъры усмотрвно сте вь Швецти по наиобстоятельныйшимь примъчаніямь и запискамь, чинимымь не отв врачебныхь, но отв другихь и притомь совершенно достовбрныхь писашелей; о чемь можно смотрыть вы Комментаріях в Королевской Шведской Акаде-

міи Наукь 1755.

Не упоминаю здось о прививаніи воспы, посредствомь коего еще больше народу сохраняется. Положимь на примърьсреднимь числомь, что изь десяти человькь, кои лежали вы натуральной вость, одинь только умираеть: каждая уже разность будеть, ежели мы сравнимь число ихь сь тьми, кои выдержали прививную! ибо извъстно, что от прививной воспы не умираеть и сотый; а можно показать шакіе примбры, гдб изв тысячи человбкв, коимь оная была прививана, и ни одинь не умерь. Вбдаю, что и самое сте малое число трхв, кои умерли будучи вв прививной вость, многимь уже наносить не малой страхв отв полезнаго сего и роду челов в скому столь выгоднаго изобротентя; однако все сте достойной оному похвалы оппнять не можеть нимало. Важность сего дрла требуеть, чтобы для твав, кои не имбють еще довольнаtitality.

ro

го о томъ свъдения, изъяснить оное здъсь обстоятельные и понятные.

Воспу прививають слфдующимь образомь: На кожф, на примърь у руки, дфлается сперва ланцетомь весьма маленькая и легкая ранка, вы которую послф вкладывають нитку напитанную воспянымь гноемь, взятымь от такого человька, который тогда имфеть на себф добрую и не сильную воспу, а до болфзни сей всегда быль здоровь и чисть во всемь тфлф. Спустя восемь или десять дней послф заложен в такой нити вы ранку выступаеть хорошая и легкая воспа, а изь самой оной ранки вытекаеть нарочито много гноя, и наипаче по созрыйи самыхь воспинь.

Понеже самое пляжелое и опаснвишее для твхв, кои лежапів вв напуральной воспв, время бываетів то, когда назрвваютів и наливаются гноемв у нихв воспины, то не справедливве ли будеть причину, для чето столь мало людей умираетів отів прививной воспы, приписать самому теченію онаго гноя? Ибо, ежели не очистится симв способомь твло отів безмврнаго его множества, можно тогда заключить св ввроятностію, что отів онаго ежели не смерть, то конечно воспослвдують А 4

пли продолжительныя оныя бслбани, каковыя частно случающся по окончаніи воспы, или по крайней мбрб во время еще самой 60лвяни произоидунь вы больномы плякчай-

ште припадки.

Положи шеперь на примбрв, чтобы кто нибудь умерь от прививной воспы : то я заподлинно могу увбрить, что онь твмь меньше свободился бы оть смерти будучи и вы наптуральной воспы, для того что высей товло его было бы еще больше отпятощено самымь онымь гноемь, копюраго стечентемь на противы того выпрививной вость оно облегчается (\*).

Какв способь сей прививашь воспу у вабшняго народа еще не вы употреблении, по не полезное ли будеть для общества сїе наше предпріян їе, ежели мы постараемся показать средство укрощать хо-тя только свирбпость натуральной воспы? А что дбло сте дбиствительно возможное, то я легко и ясно бы доказать мого всякому, ежели бы тому не препяпствовала забсь крашкость моего предложения. Да и не должно думать, чтобы одни **ТОЛЬКО** 

<sup>(\*)</sup> Кто желаеть больше знать о такомы при-виванти восты, тоть можеть о семь читать ежемысячныя сочинентя 1755 года, мысяца Генваря , на стран. 37

только лвкари вв состояни были знать принадлежащия кв лвчению опасной сей больни средсива: ибо много еще находится такого, которое и простей народы можеть легко понимать, и обращать вы пользу своихы больныхы; а симы способомы можно уже б деты безы сомный много сохранить людей, которые инако пропадають преждевременно оты погибельной сей человыческому роду язвы.

О семь то намърень я здъсь говорить. Чего ради предложу прежде о самой больни, а по томь покажу и пристойных

кь освобожденію отв ел средства.

### TAABA I.

### О Натуръ воспы.

Воспа, болбань всякому довольно извбстная; однако св самаго начала, то есть на другой, а иногда еще и на третій день, когда ею человвко разнемогается, узнавать ея трудно, и не можно еще точно погда предсказать, подлинно ли будетв у его воспа, или другая какая немощь. Нападаеть она больше на малольтных двтей, нежели на варослых и вамужалых лидей, и на твх полько, кои ею прежде никогда не страдали: ибо весьма рфдко случается, чтобы которой человфко во жизнь свою имбло оную на себб два раза; хотя на-противь того и довольно есть таких примбровь, что нфкоторые люди весь свой вфко препроводили не имбво на себб никогда воспы. О болбзни сей иногда не слышно бываеть чрезь многте годы; а послоб, како начнеть она ходить по народу, во всб почти домы переходить, тако что очень немногте остаются от вя свободны. Самое сте множество больных на поваль ею тогда лежащих втом , кои до того вы вость еще не бывали, а вы то самое время имбють у себя горячку и другте нфкоторые, общте оной сы другими больнями припадки, справедливую уже причину подаеть подозръвать и опасаться, не воспа ли самая и на их втогда наступаеть.

Прежде предложу о простой и легкой воспь. больной начинаеть сперва больть головою, слабьеть, и становится ко всему льнивь и неповоротливь. Къ сему тотчась присоединяется лихорадка съ жаромь, такъ что все тьло у его разгорячается, лице рабеть и горить, иногда текуть изъ глась и слезы. боль чувствительные становится въ груди подъ лошкою, къ которой присовокупляется брезгливость съ рвотою; но чаще ломить нестерпимо под-

поясницу. Иные со всёмь будто шунбють или столбен вють, и безпрестанно дремлюшь; другіе безпросыпно спять, а на младенцовь часто нападаеть родимчикь, или одиль шолько обморокь, однако опасности дальней отв такого родимчика ожидать не должно, понеже оной по прошестви перьваго времяни сей болбани самь собою пропадаень, и никакого послъ себя не оставляеть вреда.

Посль того вы претій, четвертый, или и вь пяшый день выступають сперва на лиць, а по шомь на груди и на рукахв маленькія красныя пяпна. Тогда прежніе принадки или со всвые пропадають, или вы сильной восий по крайней мыры наро-чино только уменьшаются. При семы же должно и сте примычать, что чымы скорве оныя пяпна выступять, твмв воспа самая будень хуже, а чвмв пожже, півмв лучше.

Чтобы удобнте сте понять, то за потребное я нахожу здтоь извяснить, чемь разнишся проетая или ръдкая во-спа от слипной? Ибо хотя объ они вы самой вещи одна и та же болбзнь, однако вь разсужденій соединяющихся сь оными припадковь разность вы нихы бываеты

великая.

Простою или реджою называется та воспа, вы которой воспины одна от другой отстоять на нарочитое разстояние; напротивы того вы слипной, которую простой народы называеты также сы лолужою, одна воспина сы другою такы близко сходятся, что по нагноени своемы, особливо на лицы, всы почти сливаются вы одины вереды, который гноемы своимы разыбдаеты всю находящуюся поды собою кожу. Изы сего можно легко понять, что сливная ради множества своихы воспины должна быть опасные простой, и приключаеты тяжчайте, нежели сля, припадки. От простой мало людей умираеты, но большая часть от сливной; а притомы, что воспа будеты на послыдокы сливная.

Выспіупающія на третій, четвертый, или пятый день пятна чась отів часу поднимаются выше, и во всемь становятся больше, красньють, рдятся и болять, и дылаются настоящими воспинами, а на послыдохь вы осьмый день и наливаются гноемь сперьва на лиць, а потомы и на прочихы частяхы тыла. За хорошія воспины признаются тыв, которыя нарочитю высоки, на верьху у себя

не оказывають никакой ямки, и отв цблой и здоровой кожи вокругь отличены красненькимы колечкомы: напротивы того плоскія и сивыя или багровыя худы. Около воспины нарочито піакже пухнеть и надымается кожа такь, что ежели у котораго больнаго будеть ихь много на выкахы, то оны чрезы нысколько дней и глазы отворять не можеть. Опухоли и надмонію такому подвержены бывають наипаче лице и руки: однако оную должно почитать за доброй знакы, какы то извыдано уже самымы искусствомы; ибо изы того можно погда заключать, что скопившаяся вы тыль воспяная нечистота или матерія великою силою изы онаго понуждается воны на его поверхность, и выгоняется вы воспины.

Напротивь того вы сливной вость дылается сте нысколько инако: ибо востины вы оной вдругы толикимы множествомы и столь густо высыпаюты, что они сливщись вмысты одну будто, но преширокую и большую востину составляюты, которая мало вверыхы поднимается, но на подобте рожи разпространившись по всему лицу все оное будто однимы краснымы пузыремы накрываеты, и на послыдокы вы осымый день становится была.

Голова потомь чась отв часу пухнеть и толстветь, затворяются гла а, и кромв того или тотчась по выступлении самых воспинь, или спусия послы того одинь или два дни изь роту начинаеть вы великомы множествы печь слина, и оная продолжаенися піакимі образомі даже до одиннапцаппаго дня опів самаго начала болбани. Послб того уже выходить она св прудностію, и у больнаго начинаеть сохнуть вы гораб такь, что, ежели онь старается что нибудь проглотить, принуждень бываеть оное сь кашлемь выкидывашь назадь.

Вь разсужденіи простой и рідкой воспы надлежить также примъчать и сте. что воспины во оной, како они во осьмые супки нальюшся гноемь, начинающь уже носколько желибинь, морщинься и подсыхать, и во четырнатцатый день на подобіе чешуи лупятся и со всёмо спада-ють; но на рукахо и на ногахо держатся они еще нёсколько долёе.

Ежели припадки посл одиннатизтаго дня болбани мало по малу начнуть умень-шаться, то смбло уже можно тогда на-двяться, что больной выздоровбеть на послёдоко совершенно. Однако время сте соединено бываеть еще св великою опасностію; ибо содержащійся во воспинахо 687 11

тной по большой части опускается и отрыгаеть вы кровь, и такы причиняеть лихорадку и другіе весьма опасные припадки, кои не рыдко больнаго лишають и жизни. Но о семы упомяну я подробные ниже сего вы надлежащемы своемы мысты; а теперы довольно было показать только вобще генеральное понятіе о сей бользни, по которому можеть всякой легко познать ея теченіе.

Кром описанной теперь настоящей сей и подлинной воспы случается иногда еще и другая, которую называють не настоящею или обманчиною по тому, что ть, которые хотя такую воспу на себь и имьли, однакожь настоящей не минують, но оной такь же, какь и ть, кои ея еще не имбли, когда нибудь, пюлько подвержены бывають. Трудно распознавать обманчивую стю воспу от настоящей, св которою она иногда такое имбеть сходство, что ея опів оной и отличить никакв не возможно. Опів сего то часто и происходить сте, что мно-гте люди имъвь сперва на себъ не настоящую воспу, на последоко впадають вы настоящую, и по тому думають о себь, будто бы они два раза были вы вость, но вь самомь двав одинь только разв: ибо первая была на нихв не настоящая, а подлинная

линная уже посль. Но тоть, кто по вышепоказанному описанію теченіе подлинной воспы разбереть обстоятельно, вы распознаніи обманчивой не ошибется; понеже сія столь порядочнаго теченія не наблюдаеть, и обыкновенно проходить скорье настоящей. И такь ошибки здылать вы распознаніи обманчивой воспы оть подлинной не можно, развы только сы перваго взгляду и на такомы человыкь, у котораго не можно было намы примытть ни начала, ни окончанія его бользни, но котораго случилось увидыть только одины разы какы будто мимоходомы. В прочемы обманчивая воспа не столь опасна бываеть, какы настоящая или подлинная.

### TAABA II.

О авченіи воспы св самаго ея начала даже до высшупленія воспинв.

Я уже выше сего объявиль, что узнавать сто болбань вы самомы ея началы весьма трудно: ибо вы оной тогда почти ничего еще не можно примытить такого, что бы не случалось во всякой горячкы. Да и горячка такая всегда соединяется сы воспою, и вы самомы дылы служить она то-

тда Напурв почно півмв инспрументомв, помощію которато воспяная оная зараза изв внутреннихв частей півла выгоняется на внішнія, а наиначе на поверхность кожи. Хотя же кто и не узнаеть болівнь сію св самаго ея начала, однако опасности отв того слівдовать не можеть никакой; какв о семь можно усмотріть изв ниже-

слвдующаго.

Я теперь только обвявиль, что воспа изы внутренности пібла на поверхность его, то есть на кожу, выгоняется помощію горячки. Положи теперь на примірь, что ты вы состояній горячку стю отгогнать. Что же изы того послідуеты ? Конечно заблаеть больному худо: ибо воспяная оная зараза или матерія, которую должно было выгнать горячкі изы тібла, остіанется вы его внутренности, и произведеть другія претіяжкія и смертельныя больни. Слідовательно горячка такая необходимо нужна вы вості, только чтобы она была уміренна; инако, ежели она заблается чрезвычайно сильна, опасаться должно, чтобы отів смутныхы пібхы и непомірныхы, кои тогда во всемы тіблю отів ея возбуждаются, движеній воспяная матерія не залегла бы вы какую нибудь внутіреннюю его часть, и не произвела бы такихы худыхы слідаствій, каковыя быватють

ють вы первомы случай опты невременнаго

ея уняшія.

И такв главнвищее правило, которое должно наблюдать во все время продолжающагося лвченія воспы, состоить вы томь, чтобы прилвживе разсматривать стремленіе самой сей горячки, и оную смотря по обстоятельствамы или укрощать или побуждать. А чтобы сіе правило всякой могы удобнье понять, то прило

мбчать надлежино слбаующее.

Горячка пв сезмырномь стремлении признается тогда, ежели у больнаго жаръ безмбрно силень, глаза стоять красны, взорь дикь и суровь; ежели онь сильно бредить, языкь у его сухь, заскорбь и на верьху мостами будто разсодался. Ежели у больнаго учащае пр дыханіе, моча испускается красная и будіпо огневая; ежели понимаеть его тоска или сжимаеть у его грудь, и жалуепся онь на великой ломь вь головь или поясний, вь спинь, пакже в руках и в ногах ; жилы стоять надменны или надупны, и бысптся весьма сильно такв, что біеніе оныхв на вискахь и вь другихь мосшахь, габ они лежать ближе кь поверхноси и пьла, можно примотить самымь глазомь.

Весьма сласою и безмбрно уже прошивь надлежащаго малою горячка вы больномы

почи-

почипается тогда, ежели он не жалуется почти ни о каком жар и жажд, вы лиць бльдень, или мало что красновать; ежели онь тотчась вы самомы началь бользни безмырно слабыть, и голова у его не очень болить, или припадають временемы нысколько продолжительные обмороки.

Средний и наимучший стелень год ячки бываеть тогда, ежеми больной чувствуеть вы себь дыйствительно жарь противы обыкновеннаго больше, однако не паковы, чтобы оны ему быль совершенно несносень; ежеми оны чувствуеты вы себь умбренную только жажду, свободно дышеть и не слышить у себя на сердыв никакой тоски; голова у его во всемы свободна, ими болить только слегка, и моча испускается не весьма красна.

И такв, ежели тотв, который ходить за больнымь, приложить котя малое стараніе разсматривать случающіяся сій вы ономы обстоятельства, безы сомнынія узнаеть тотчась, вы какомы состояній больной его находится; а по тому можеть учредить и его лыченіе слыдую-

щимь порядкомь.

1) Св начала болбвии, хотя бы еще и не извъстно было, булеть ли пточно на больномы воспа, или нъты; птопичась надлежить дать ему слабительное: ибо 6 2

сїе уже одно много буденів способствованть кв облегченію или и кв предупрежденію многих припадковь, каковые супь поска, брезгливость, рвота, ломь или боль подв лошкою вы груди, и поносы, которой также иногда припадаеть. Слабительное такое составляеть і) ревень, котюрато употребленіе показано уже вы домашнемь лочебнико, то есть, мальчику шестилътнему дать его четверть золотника; десяпилътнему треть или нъсколіко побольше; пятнатцатил втнему половину золошника; взмужалому до двашцапи лёнів двё трети золотника; а человёку совершеннаго возраста цблой золотникв. Ошибки никакой не заблаешь, ежели тъмь, кои покръпче в свеемь сложении, дашь ибсколько и побольше: понеже мбры сій показаны здісь довольно уміренны. 2) Для трхв, кои меньшаго пропиво сихв возраста, слабительное оное можно приготповить следующимь образомь. Напіри ревеню во порошоко одино золотнико, и всыпь оной во стекляной стакано или во муравленой горшечекь: налей туда сь чепыре или св пять ложекв кипятку воды; [нагръвши прежде судно, ежели оно бучтобы от кипятку не треснуло] смъщай воду св ревенемв, и накрывь судно поставь

ставь его на нВсколько часовь вы теплое какое нибудь мбсто, чтобы вода выпянула вы себя изы ревеня всю его силу. Послы того выложи все сїє ві полошенцо, которое поръже, и выжми сквозь оное одну только воду, а ревень выбрось. Ежели у кого случится сахарь, то можеть онь его кусочикь опустить выстю воду для поправленія вкусу, а неимущіе могуть употреб-лять ея и безь сахару. Новорожденному или нъсколько подрослому уже младенцу даетися ревенной сей воды по половин в ложки; посль чего тошчась дать ему сосать у машери или у кормилицы своей грудь. Годовому младенцу можно дашь нВсколько побольше половины ложки, двугодовому полную ложку, а пірил віпнему по-больше. Ежели коппорые младенцы слабы, птъмъ можно мъру такую убавить; и естьли съ одного пртему ихъ не просла-битъ, тогда спустя послъ того два или при часа можно дапь и другой пріемь, пюлько нісколько поменьше прежняго.

2) Давши слабительное, как в окончить оно свое двистве, надлежить примвчать, каково будеть посль того состояне больнаго. Ежели горячка окажется безмврно сильна, [хотя она посль принятаго вы таком случав слабительнаго обыкновенно становится и нарочито сносные] тогда

6 3

посту-

поступать надлежить следующимь образомь больнаго, ежели по дозволять его состояние и обстоя пельства, должно содержаль во шакомь поков, которой бы не было весьма сырь, воздухь вы себь имбль бы всегда чистой и никакимь дурнымь запахомь или духопюю наполненной, а притомь чтобы вь ономь не много и людей было. Хранинь больнаго в весьма умбренной пеплотв и небольшей, какв которую оно обыко сносить бывши здоровой. Есньми же напрошивь того будунь его чрезмбрно укрыванть и окупныванть одбялами или шубами, то не только что онв больше будель от того тосковать, но самое сте безмърное куппанье причинипъ еще много других в тяжелых в припадковы, помъщаеть выступать вость, и бользнь заблаеть пляжелье. Ложно сте внушають, будіпо, чемь больше вы тепль держится воспяной, тъмь скорбе высыпаеть у его и воспа. Повседневное искусство и наиприлфжибиштя примбчантя показывають намь со всьмь тому противное; то есть, что воспа в умбренной теплотб гораздо свободное выступаеть. Но какь весьма прудно, или почти и не возможно увбринь простой народь о справедливосни сей истинны, то от сего то закоснелаго вы такихы людяхы предравсужденія жденія и происходинів сїє весьма частю, что восна, будучи иногда сама собою можеть быть довольно легкая и тихая, отть чрезмібрнаго онаго жару дівлается тяжелою и напослідоків несносною: причемь можно утвердить за подлинно, что изів тівхів людей, кои умираютів востою, по крайней мів дівлая половина пропадаеть только отть одного ихів содержанія вів безмібрномів жару. Того ради, ежели больной сів начала болівни еще нівсколько вів силахів, можетів онів не только вів первой, или вів другой, но еще и вів третій день сидіть или похаживать вів своемь покоїв, и не принуждать себя лівжать вів постелів; а тів, коимів не дозволяєть уже дівлать сего самая ихів славоляєть уже дівлать сего самая ихів славоляєть уже дівлать сего самая ихів славоляєть уже дівлать сего самая ихів славость, могутів лежать вів постелів, однако не укрывать себя чрезмібрно многими одівлами или тубами, и руки у ихів мотутів быть совершенно на свободів.

3) Кромб того надлежить также наблюдать порядокь и умбренность вы пищб и пити. Сольной должень тогла бсть весьма мало; да и самой уже недостатокь у его вы аппетиты не дозволяеты много принимать ему тогда пищи. Довольно можеты быть будеты сы него одной только овсяной кашицы. Мяса ему тогда употреблять отнюдь не должно. 6 4 Когда

Когда начнеть его одолбвать жажда, то для ушоленія оныя давань ему онвареную воду, вы колюрую можно опуспынь немножко ржаныхи или сипныхи, а и пого лучше, ежели у кого случаться, пшеничныхь, шолько не масленыхь сухарей. И такь, ежели при наблюдеейи такого содержанія припадки у больнаго будушь нарочито сносны и умбренны, больше дблать ничего не должно, но поступать сь нимь пъмь же порядкомь даже до самаго пого времени, како начнепо высыпашь воспа. Осшаенся теперь полько наикрвпчайше подпівердить сіе, то есть, всячески остереганься, чтобы киго, какв то обыкновенно делается вы таких случаяхв, склонившись на разные соввшы своих в пріятелей, не даваль тогда больному ничего подрименемь лекарспива. Ибо не довольно разумвющие сего двла обыкновенно обо ономо шакое имбють мибите, чино вся важность тогда в том только состоить, чтобы поскорве воспу выгнать изь пібла, и вь томь намбреніи для побужденія кв выходу воспяной оной заразы очень шедрою рукою дающь больному разныя лъкарсива, однако по большей часии сь худымь успрхомь. Пусть они повыряпів мит хопія вы семь, чіпо и самыя лучшія лікарства, когда они даются отв человька, который не можеть разбирать всякія вы такомы случав міточи вы тон-кость, и ихы по надлежащему уваживань, по большей части бывають вредительны, и что много будеть безопасніе все діло простю оставлять самой натурі, нежели мітакими літакими літаки

4) Естьли же не смотря на прилагаемыя осторожности вы содержании такого больнаго какы вы пищы такы и вы другихы кы тому принадлежащихы вещахы, и не взирая на данное сы начала бользни слабительное, больной будеты крайне безпокоиться, голова у его чрезвычайно болыть, глава красныть; однимы словомы, горячка будеты чрезвычайно сильна; то вы такомы случай примычать надлежиты, не имыеты ли оны запору. Чего ради, какы скоро оной усмотрится, проходы должно

отворить промывательнымь. Промывательное вы семы случай дылается изы свсяной жидкой кашицы, вы которое можно

**б** 5 при-

приложить немножко обыкновенной соли, а имянно для двультняго или трильтняго младенца одну препь золопника; для чепырельпіняго не много по больше; для шестпил втняго половину золотника; для десяпильтняго двь преши или цьлой золошникь; для пяшнашцашилбшняго не много по больше; для молодаго челов вка и нарочито крбпкаго сложенія два или и три золотника, а для сильнаго и того побольше. Ежели от такого промывательнаго не отпворится проходь, тогда можно во оное прибавинь простаго мыла вбсомь спюлько же, сколько положено было соли. А опусканть его вы шакое промывательное, когда оно еще гораздо го-рячо, чтобы тъмъ скорбе и со всъмъ вы немъ распустилось; послё чего должно оное процібдинь сквозь полошенцо. Есньми же и по отверени прохода жарь будеть продолжаться выбольномы силень, и оны противь прежняго не успокоится, тогда вмъсто вышен казанн й хлъбн й в ды можно давать ему другое питье, которое двлашь изв отваренти воды подслащеной и подкисленой смородинным или клюков-ным в сиропом [яг дник мв ], или вмб-сто то растерши ложкою вы вод пе-ченых вблек оную процедить, которая тогда будеты имыть вы себы пріятной яб**моншо**х

лошной вкусь; и такь посль давать оную больному пить. Кь пящамь привязать кислаго півста смышаннаго сь уксусомь, приложивь вы его пятую или шест ую долю горчицы, и оное на ихь держать, пока больной вы состояніи будеть снести

сте безь дальней боли.

5) Вы пакомы содержании должно больнаго оставиль даже до самаго того времяни, како выступить у его воспа. Ежели жарь будеть чрезморно силень, тогда можно на вечерь посшавишь ему промывательное, и на другой день ко пятамо приложить опять сь горчицою тбета; а вь томь случав, когда все будеть произходи пь у больнаго порядочно и умбренно, можно и промывашельное и пъсто со всёмь оставить. Не упомянуль я здёсь ничего о пусканіи крови по тому, что дёло сіе, чтобы точно опредёлить здёсь, для которыхь больныхь и вы какомы случаб оно нужно, весьма трудно. Хотя же и можно сказать вобще, что оно больше приличествуеть но всколько уже подрослымь, нежели младенцамь, однако все сте при таких случаях оставляю я единственно на разсужденте лъкарское. Впрочемь оно заподлинно будеть полезно челов в ку крвпкаго сложентя и многокровному, у котораго сильна горячка, кв томужь nouприсоединится жарь вы глазахь, бреда, и

жилы будуть сильно биться.

б) Когда вь больномь не видно сильной горячки, по ничего не должно св нимв и Аблать, но все оставить единственно Натурь. Давь одинь разв слабительное, и опредбливь точно, какую ему употреблять пищу и какое пишье; по есть, чтобы онь воздержался совершенно отпь всякаго мяса, а довольствовался бы только овсяною, пшонною, грешневою, и другою симы подобною кашицею; вмёсто питья употребляль бы прежде показанную хлёбную воду; болёе ничего ему не предписывать.

7) Напрошивь того, ежели горячка топчась сb самаго начала усмотрится безмбрно мала, такв что больной не будеть чувствовать у себя ни жару, ни жажды, или начнетов со всвыв забываться, охолодовото у его руки и ноги, также и самое лице, тогда надлежить поступать со всбмы инако; а имянно. Понеже припадки сїи не споль часто случаются в первой, но обыкновенно вы другой, а иногда и вы претій день; то по сему и в первой день можно дать больному слабительное, и вмЪсто обыкновеннаго питья опредЪлить ему частоупоминаемую хлббную волу. И такь, ежели состояние его и на другой день

день будеть таково же, какь здысь изображено, тогда поступать св нимв надлежипів слідующимь образомь. Все тібло, а наипаче ноги полегоньку, но такь долго піереть салфетками, чтобы они начали нъсколько краснъть; къ пятамъ при-вязань кислаго тъста, примъщавъ къ нему побольше горчицы. Кром того вы семы случав, выключая только грудных в младенцовь, совътоваль бы я паковымь больнымь дань половину ложки бълаго вина, и сте, ежели имь послъ от пого не будеть лучше, по прошестви трехв или четырехь часовь еще повторить. Особливо ноги тереть чаще. В случав обмороковь, котпорые иногда нарочито продолжительны бывають, наилучиее абкарство состоить вы кисломы тасть, вы копорое примъшиванть должно больше горчины, и оное прикладыванть къ икрамъ. Можеть быть такое пфсто пробств кожу и вздуеть на ней пузырь: но сте вы такомь случав будеть полезно, и можеть служить не только ко скорому уменьшенію припадково, но и ко свободнойшему выступленїю самой воспы. Смопіри, что о семь

же дблб вв 4 главб еще больше упоминается.
Теперь приложу я здбсь еще нбкоторыя увбщанія, кои всякому знать вв таком случаб весьма нужно.

Тошчась

Топтчась св самаго начала бользни, ежели признаки окажущся будущей воспы, помышля пь надлежины о шомы і. Чинобы, сколько возможно, опівести воспу опів лица. 2. Чинобы она свободніве выступила на ружу, и не соединена бы была св пія-

желыми припадками.

Пе, вое, то есть, чтобы воспу отвратипь опів лица, абло претрудное, а вв случав, когда очень много будеть вы твль воспяной машеріи, почти и невозможное; однако слбдующій способь можно испытать сb пользою, ибо онb и удается иногда по желанію. Тотчась сb начала 60 л Взни припариванть надлежить ноги полошенцами вр шеплой вод в намочеными от чего больше отворятся находящияся вы кожы потовыя оппдушины [поры] и сама она здвлаетися мягче и слабже. Не надобно сте дълать чрезь цьлой день, особливо, ежели больной будеть имбть вв себь великой жарь, но довольно будеть припариваннь ему такимь образомы ноги чрезводинь или два часа дважды или приж. ды в день. Полегно такожде будеть пъ же ноги шерешь ему чаще слегка фланелью или другою какою нибудь суконкою, чтобы они у него немного покрасноли. Во случав пяжелыхо припадково, и когда опасность окажется, что восна 6v zemb

будеть сильна и густа, преполезная вещь вмБсто нарывнаго пластыря привязать кислаго съ горчицею півста, или толче-наго чесноку, чтобы на ихь оть того вворвало пузырь; ибо польза отв сего можеть быть двоякая: первая, что воспяная матерія отполица оттянется вв ноги, а другая сія, что при продолжающейся болбани во время кагноенія воспинь великое множество гною поворотится кв оной ранб и изв ея вышечешь, колпорый инако оставшись вы крови причинить безы сомны-нія много худыхь слыдствій. Вы то же время можно прикладывать на глаза намоченую не вы очень крыпкой водкы, или и вы простомы вины: [ опустивы вы его маленько шафрану, чтобы оно нысколько пожелтыло; ] а послы выжатую накрыко пряпку такь, что бы она была почти суха, и оную держать на глазахь четвершь или половину часа; и повторять сте вь день два или при раза на пакой конець, чтобы глаза уберечь от восты. Другое увъщание, какь я о семь выше

Другое увъщание, какъ я о семъ выше сего уже объявиль, касается до предохранения себя отъ піяжкихъ припадковь. Тъ, кои еще не имъли на себъ воспы, должны во все то время, когда ходить въ народъ воспа, наблюдать по ядокъ въ пицъти пити. Ежели случится необходимо мно-

LIMP

гимь жить вмость, или во одномь домо, вы коемь одинь изы ихь занеможены воспою, що посль того надлежить ожидань, чно между десянымь почни и ченырнаніцашымь днемь его бользни, когда начнешь на немь подсыхащь воспа, придешь она и на прочихь. Чего ради собыноваль бы я таковымь во все то время не употреблять себь вы ницу никакого мяса, а довольспівованься полько какою нибудь крупяною или пшонною кашицею, варенымь черносливомь или яблоками, или молошнымь какимь нибудь и пюму подобнымь кушаньемь. Кромб пого могупів они св пользою на каждой день ставишь ноги вв пісплую воду, и ихв тереть вв оной руками, чтобы такимь образомь опімякла у ихь больше кожа, и свободнье бы выступала изь ея испарина. Можно пакже тогда приняннь слабительное избревеню; а пинье для ихб наилучшее можеть составлянь обыкновенный яшный квась, кромь котораго другаго пишья во все то время упо-

<sup>(\*)</sup> Сочиненте сте назначиль я единственно для употреблентя бъдных в людей. Естьли же оно можеть быть полезно такожде и тьмь, кои имъя достатокь обыкли жить пороскоштье, то я за нужное признаю их вы томы предостеречь, что они предписанною забсь легкою такою Дтэтою, кы коей можеть быть

Напослёдоко здёсь примёчанія достойно и сле, что или топтчась вы первые дни по начащи болбани, или уже по высшупленій на півлів самых воспинв, припадаень иногда понось, которымь болбань сія легко перебивается вы порядочномы своемь течении, и опр того напоследокь аблаенся опасною. Слабый обыкновенно проходо не вредить; а хотя онь у котораго больнаго здвлается нвсколько и трудновать, однакожь не надлежить отв того тогнчась опасаться худаго слёдствія. Естьли же припадеть тогда двиствительный понось, по оставлять его на свою волю не должно. Чего ради въ такомъ случав, како скоро оно окажется, соввтоваль бы я больному тотчась дать истолченых вы самой мылкой порощокы pa-

нимало не привыкли, могуто себя чрезвычайно ослабить; чего напротиво того необыкщие употреблять леликативощей пищи опасаться не должны. Чего ради первымо, то есть достаточнымо, прежде, нежели получато самую стю болбань, можно дозволить употреблять но колько, однакожо очень мало, и то молодаго и легкаго мяса, а при томо носколько пива или вина, ежели только ко оному привыкли, однако гораздо меньше, нежели како обыкли оное употреблять прежде того времени.



раковых жерновокь, на примърь въсомь треннью часнь волотника, а малолыному младенцу щестую онаго долю, копюрой пріемо можно и повіпориль три или четыре раза вы день. Порошок сеи дается слодующимь образомо. Сперва надлежипо его смбшать хорошенько св водою на лошко, и тако велоть больному принять, а послё запить немного хлебною водою. А какь скоро уйменися понось, пю не должно больше и употреблянь сего порошка. Естьми же понось не скоро укротится, тогда отръзавь тоненькой ломотокь ревеню поджарить его на угольяхь, такь какь поджаривають на ихв хлвбные ломотіки; посль чего надлежить его изтерешь вы порошокь, и часть онаго дать вы водь, на примърь младенцу, который меньше полугода, в сом столько, сколько могушь пошянушь шри или чешыре перешные зерна, годовому вдвое противь того; двугодовому втпрое; четырельтнему столько же: но по прошестви двухв часовь пріемь оной должно повторить. Мальчику от шести до десяти льть пятью или шестую долю золошника, и тако же, какв и прежнимв, ежели нужда поптребуеть, приемь такой повторить. Томь, кои будуть свыше таких в лоть, давать надлежить и порошка онаго больше; да

и пріємі чаще повторять. Во все сїє время какі брюхо, такі и ноги у больнато надлежить укрывать теплыми полотенцами, и всячески остерегать, что бы оныя, когда его для нужды сажають на ночной стуль, ни мало не простудились. Вы случав весьма сильнаго поноса, и котораго показанными теперь средствами унять не возможно будеть, больному надлежить поставить промывательное изы хлібной воды, которую вы семы случав варить должно сы ржанымы хлібомь, и притомы противы той, которая вы питье употребляется, нарочито гуще; посліб чего прибавить вы оную одну лошку уксусу, а ежели оны будеть очень крібнокь, що половину лотки. Но груднымы младенцамы промывательное такое не годится.

Впрочемь, когда пристанеть кь больному понось, не должно ему другаго кушанья давать никакого, кромь ишонной, грешневой и тому подобной кашицы, а при томь и варить оную просто сь водою, а не сь молокомь, и безь масла. Питье должно состоять изь одной только хльбной воды, вы которую достаточные люди могуть, ежели похотять, прибавлять немношко лимонныхы корокь, или скобленаго мушкатнаго орбху.

B 2

TAABA

## TAABA III.

о абчени воспы по выступлени ся на ружу даже до нагносния самых воспинь.

Все то, что я вы прежней главы предложиль, сы пользою можно употреблять, пока еще воспа не выступила на ружу; а что должно дылать по ея выступлении,

о томь покажу тенерь.

Как скоро воспа выступить на ружу, то больному становится во всемь легче, и начинаеть онь уже будто выздоравливать; однако около осьмаго дня свсей боонтани, по причино приближающагося нагноенія самых воспинь, подвержень бываеть паки новымь припадкамь. Во все сте время не должно св нимв ничего аблашь, но наблюдать только вышепоказанную осторожность и порядоко во пищо; также и пишья ему другаго не давашь никакого кромб частоупоминаемой хлббной воды. Но како во сте время обыкновенно по ночамь умножается вы немь жарь, и онь отв того больше тоскуеть, то вы случав такого жара, ежели онь будеть чрезвычайно силень, и къ томужь присоединишся у его запорь, можно ему вы сти дни одинь или два раза насшавишь про-Bb мывательное.

вь семь только состоить все то лвчение, которое должно наблюдать от самаго выступления воспинь даже до ихы нагноения, котторое бываеты почти около осьмаго дня бользни; а кромы сего другихы лыкарствы употреблять никакихы не

должно.

Оспіается здёсь упомянуть только о нёкоторомь одномь припадкё, которыи вы сїє время у таковыхь больныхь обыкновенно припадаеть, то есть часто случается, что больной тогда сь трудносттю глопроглотить, выходить у его носомь. Кромь того, будучи во снъ пробужается вдругь съ великимь страхомь, чтобы не задушиться, и съ великою трудносттю погда едва можеть собраться св духомь. Припадоко сей можеть оно легко отвратить, ежели только напьется чаю со сахаромь леденцомь, или, что еще и того лучие будеть, взявь изподоволь вы тывни высущеных красных трх диких маковыхь цевтковь, кой обыкновенно вездв почини роступив по пашнямв между жлб-бомв, или вмвсто оныхв калинныхв цввтковь, настоять ихв вы кипяткв такв. какь настанвають самой чай, и потомь принять настоянной сь ими сей воды половину чайной чашки; что можно во нужномь случав и повторить. CAY-

Случающійся в с время понось рвдко бываеть полезень, а какимь образомь с нимь тогда поступать, о томь смотрвть надлежить вы прежней главв.

## глава IV.

О лВченій воспы, когда она наливается гноемь и подсыхаеть.

Воспа начинаеть наливаться вы осьмой день послё своего наступлентя; а повнается сїе изв того, чпю воспины уже тюгда чась от часу больше быльты, полнбють и надуваются, сперыва на лиць, а потомь и на прочихь частяхь пібла. Но прежде осьмаго дня начинаетів уже много шечь у больнаго изв рошу слины, которая потомь мало по малу становится гуще, и больной отв того больше безпокоишся, особливо когда самыя воснины начинають уже подсыхать; что случается ококо одиннатцатаго дня болбани; и тогда лице, которое до того времени было толсто и надуто, начинаеть опадать, напротивь того руки пухнуть и толствть. Вы простой и рвдкой воств все стелегко и сносно происходить такв, что едва случается тогда вь оной что ни-

будь чрезвычайное, которое бы требовало особливои осторожности, но напротивь того вы сливной ужасные приключаются припадки, какы на примыры нападаюты тотда на больнаго горячка, бреда, спячка и инфламмація или разгорбніе внупіреннихь частией, котторыя легко причиняють и самую смеріпь. Вы ей же восій множестью воспинь слившись вмостов, когда начинающь сохнушь, напоследокь ссыжающся на подобіе коры во большой и широкой спрупь, который пространствомъ своимь великую часть лица, а иногда и все оное накрываенів, подв коимв лежацій гной самую кожу весьма глубоко разыбдаеть и роет такь, что по спадени такого спірупа остіаються на лиці у тако- го челові ка в всю его жизнь не только большія рябины, но будто какв и язвины.

Вь простой или радкой вость мало во сте время случается такого, которое бы пребовало особливаго примбчинія; но большая часть сего, что сказано будеть ниже сего, принадлежить до сливной. Ибо в перьвой, ежели все порядочно и тихо произходить, почии ни акого лъкарства не надобно. Когда во оной воспины довольно уже налились гноемь, и совершенно назрбли, то должно тогда гною дать свободной изв оных выходь, прочи-

B 4

прочикая каждую воспину булавкою. Такимь образомь можно предупрединь гной, чтобы онь изь воспимь не осбль вы кровь, и не произвель бы разныхы оты того случающихся припадковь. больнаго надлежить содержань всегда вы умбренномы тенль, какь о пюмь уже довольно было упомяну-то и прежде; давашь ему легкую пицу, и вмъсто пи пъя хлъбную воду. Естьли жарь у его будеть великь, языкь сохнуть, у воспинь на верьхушкахь появяться синевашыя пяшнышки, и они нъсколько осядушь, тогда вы хавбную оную воду примбинванть надлежинто больше клюковнаго соку. Но вы томы случай, когда и пятны оныя на верьху у воспины, и остдание вь оных примътятся такія же, какь и прежде были, а больной не буденів иміть или никакой, или весьма малую горячку, совъповаль бы я ему одинь или два раза дать по половинь ложки краснаго ви-на разведенаго водею. Тогда уже можно все дбло оставить на волю самой Натурь даже до ченырнатцащаго дня, щи-

Вы сливной во пы, или что сы лопужою, больше труда пребуется; и во первыхы оказывающее я уже прежде осьмаго дня течение слины надлежиты всячески побуждать. На такой конецы чаще, но

по

по немногу пить вышепоказаннаго избриких в маковых в или калинных цевыковь чаю. Не худо шакже будешь полоскапь рошь теплою водою, что такую же пользу, какь и оной чай вы семы случаб приносить. больнаго како во все прочее, тако наипаче во саме сте время его болбани всячески удерживать от тялеему только самую легкую, всячески старатных, чтобы вы поков, вы котторомы онь лежить, воздухь быль чисть и умьренной, и не было бы вы немы весьма жарко и душно. Рубахы и прочаго былья на немы тогда перемынять не должно; ибо можеть онь от того кв крайнему его вреду легко простудиться. Ежели вы то время, когда налившись гноемы во-спины начнуты подсыхань, припадеты у больнаго понось, то онь уже погда не столь опасень, лишь бы не очень быль силень, то есть не соединень сь очевиднымь вы больномы уменьшениемы силь. Вы прочемы примъч ты надлежить слъдующее.

1) Ежели по нагноении воспины больной будеты нарочито спокоень, то вы содер-

жанти его не должно двлать никакой перемены, и не нужно тогда никакое лб-

карство.

2) Пишье у его должно бышь всегда кисловатое; чего ради надлежить во оное

примбшиванть клюковнаго соку.

3) Ежели больной чрезвычайно слабь, п горячка у его не очень велика, погда не худо можеть быть будеть давать ему по половинь лощки, дважды или прижды вы день, разведенаго водою краснаго вина.

4) большей осторожности пребуеть самое то время, когда начнетів подсыхать воспа; и тюгда пю прильжно надлежитів примьчать, вы какомы состояній будеть больной находиться. Ежели оны будеть тюсковать, или и чрезвычайно бредить, тюгда на всякой день ставить ему промывательное, и чаще давать питья сы клюковнымы сокомы: да и послы четырнатцатаго дня, когда уже воспа нарочитю подсохнеты, весьма будеть полезно для отвращенія тыхы же припадковы принять ему для слабительнаго надлежащую мыру ревеню: ибо прослабивы онымы животы состояніе его много поправится; и тоже лыкарство вы случаь возвращающихся тыхы паки припадковы должно послы двухы или трехы дней повторить.

Для лучшаго понянія, что должно дблать вы томы случай, когда во время подсыхающей уже воспы здблаются тяжелые и опасные припадки; за необходимое

я признаваю показать здёсь также и причину, для чего время сте вы восты преды прочимь опасное; и для чего вы то самое время больше, нежели вы другое, стра-ждуще сею болбанію умирають? Причи-ну сему легко пойметь всякой, ежели пюлько разсудить, что воспины вы воспъ съ лопухою налившись гноемъ сливаютися и ссыхаются часто во одино струпо такь, что гною изв подв онаго не можно никако ни выдхнуть, ни вытечь; и такь должень онь неотмень опуститься в кровь, и залечь во внутреннія чавая во оныхо инфламмація или разгорбніе, горячка, а отб сихв уже и многія опасныя другія сл бдствія. Напротивь того вы простой и рыдкой восты, какы такого струпа не бываеть, не ложится вы кровь и такого множества гною, хотя часть его н вкопорая безв сомн внія в оную и осблаеть. И такв, ежели бы возможно было предупреждать самой гной, чтобы онь не опускался вы кровь, то бы весьма мало было опасности от сей болбзни, и можеть быть очень бы немногіе оть ея умирали, нежели како мы ныно ежедневно вв самомв двлв видимв. Разсмотримв же теперь, можно ли отвратинь оной гной от крови, или не можно? **Ч**тобы Чтобы ничего не допустить из воспинь гною вы кровь, здылать сего не возможно; но для отвращения от ея большей его части слыдующия средства совершенно могуть быть полезны и, ежели оныя довольно будуть наблюдаемы, можно увырить, что такимы способомы многіе люди могуть избавиться от преждевременной вы семы случав смерти.

1) Прежде совбтоваль я, вы простой или рбдкой востб прочикать воспины булавкою; но какы тбже воспины по первомы прочкнути и по выпущени изы себя гною наполняются онымы по прежнему вновь, то и прочикать ихы надлежиты

снова.

2) Какв скоро пристанеть кв человыму воспа и припадки окажутся у его весьма сильны, то совытоваль бы я тотчась св самаго начала бользни кв икрамы у ногы такв, какв уже о томы выше сего показано, привязать кислаго св горчицею тыста, или толченаго чесноку, или, ежели можно будеты вскоры тогда промыслить, нарывной пластырь. Понеже св начала бользни мласенцы часто или брыдять или нападаеты на ихы крыткой соны и продолжительные обмороки, то по сему и не должно опасаться, чтобы происходящая боль при нары-

нарываніи кожи опів такого пластыря была имв столь не сносна, но напротивв того вбрить, что они почти тогда ея и не чувствують. Какь от такого пластыря на икрахь, гдб онь будеть приложень, вздуется напоследокь кожа вы пузырь, и по сняти ея останется тамь рана или садно даже до самаго того времени, какъ начнеть засыхать воспа, то изв оной раны чрезь все то время вышечеть великое множество воспянаго того гною; и такъ получивши тівмь містомь свободной себів выходь изь твла не осядеть онь во внутреннія его и кв продолженію жизни нуживий части. Что касается до перевязки сей раны, то наилучий кв тому способь покрывать оную свъжимь капустнымь листомь или намазанною свъжимь и несоленым в коровым в маслом в ирхою. По окончани же болбзни заплягивается пакая рана, обвязывая оную чистымь только полошенцомь, пошрусивь прежде слегка на ее немного бълиль или шолченаго вы пыль мвлу, или прикладывая на ее бвлильной живучей пластырь, который показань быль вы пробыщенной кы домашнему лечебнику Апшекв.

3) Ежели покрывающій воспины струпь очень будеть толсть, тогда должно его отмятчить, чтобы онь какь можно скорбе

om-

отсталь отв кожи и свалился, и такимь бы образомь свободные могь вышечь скопившйся поды онымь гной. Вы семы случай должно струпь намазывать свыжею смещаною. Вы пресильной сы лопухою восты тольной такой и півердой струпь такь иногда запираеты поды собою гной, что оны не имыя изы онаго себы ни малато выхода, и здылавшись напослыдокы весьма бдокы производиты вы пібхы мыстиль. Тогда уже другаго средства кы отвращенно сего не остается, какы полько призвавы наискорые искуснаго лыкаря, дозволить ему проколоть самой струпы ланцетомь, и такимы образомы выпустить изы поды онаго гной.

4) КЪ отвращенїю приключающейся весьма сильной горячки и другихъ тяжелыхъ припадковъ во время подсыханія воспы, а наипаче, когда больной цепѣнеетв, ничего не спить, бредить, чувствуеть великую тягость въ груди, мучится сильнымъ кашлемъ, и проч. наидъйствительнымъ кашлемъ, и проч. наидъйствительныйшее и безопаснѣйшее лѣкарство ревень, котораго дать ему пристойной пріемъ для слабительнаго, чтобы онымъ осѣвитая въ кровь ѣдкая оная воспяная нечистота могла выйти изъ тѣла низомъ. Послѣ

сего вы тоты же почии часы больному спановится легче, и, ежели опять окажутся тыже припадки, то же оты оныхы употребляны и лыкарство; и такы оное вы нужномы случай можно иногда повторины до трехы разы, или и больше. Довольно можеты быны всякому извыстно, что многіе изы тыхы, кои встаюты послы воспы, хотя впрочемы кажутся уже и здоровы, однако подвержены бываюты другимы болынямы; а причиною оныхы, оты которыхы они происходяты, есть самый птоты оставшися вы крови гной, и не выгнанный настоящимы образомы изы пыла. Для предупрежденія же сего не только нужное, но и преполезное дыло, прочищать такимы способомы тыхо.

5) Выздоровъвши от восты должно еще чрезь нъкоторое время крайнюю осторожность наблюдать вы пищь, и кы обыкновенной прежней приступать помаленьку. Кромы того по прошестви почти двухы недыль надлежить еще прочистить тыло слабительнымы; впрочемы, будучи уже и здоровымы чрезы долгое время остерегаться оты простуды.

Можно бы мнр было здрсь теперь симв и окончить мое дрло; но какв часто мно-

тте спрашивають, какимь бы образомы можно было предохранить лице от рябинь, которыя иногда столь сильно оное портиять; предложу я здёсь также и осемь нёсколько.

Онт простой и легкой воспы рбдко на лиць остаются рябины, однако для большем предосторсжности полезно будеть каждую воспину посль совершеннаго ихв созрытя и налиптя прочикать булавкою, или, когда на по время можно имбіпь лькаря, прокалывать ланцетомь, чтобы изь оныхь могь вытекать гной. Вь воспы сь лопухою стараться надлежить, чтобы струпь на лиць не долго оставался; и такь должно его скорбе отмятчать, кв чему я выше сего предлагаль свежую сметану. Ежели не скоро спадетів струтв, а воспинв уже большая часть нарочито подсохли, погда пригодно будеть оное лъкарство, которое показано вы первомы томъ ежемъсячныхы сочиненти, мъсяца Марта, на страниць 258, то есть: мь-сто оное, которое толще у струпа, на-мазывать должно мазыю составляемою изв свежей сметаны и толченаго во пыль мблу смешенных вместев. Однако я св моей стороны не совттоваль бы такь, какь тамь показано, мазать оною мазью

все лице; довольно будеть смазывать только самое полствишее м сто у струпа, о которомь не можно надбяться, чтобы оно для самой той своей полстоты могло скоро подсохнуть, и само собою свалиться.





· C. Foona

The policy of the property of



